COMPO EXPERT México S. A. de C. V.

FICHA TÉCNICA

VITANICA RZ O

Biofungicida líquido

Registro Sanitario: RSCO-FUNG-0395BA-X0342-375-4.8

Datos técnicos

Propiedades físicas	Composición garantizada. %
Apariencia: Líquido	*Bacillus amyloliquefaciens* R6-CDX $1.2*10^9$ UFC/ml
Color: Verde	que equivale a 4.8 % de I.A.
Densidad 1.1 Kg/L	
pH: 3.5	

Almacenamiento: Almacenar en un lugar protegido de la humedad, el calor y la luz con temperatura entre 5ºC y 30ºC, en su envase original puede ser almacenado, una vez abierto el envase deberá ser cerrado adecuadamente y depositarse en un lugar seco.

Importado y distribuido por:
COMPO EXPERT México S. A. de C. V.
Av. López Mateos Sur 5060 Int. 3A
45239, Zapopan, Jalisco, México.
Tel. 33 36121512-

COMPO EXPERT México S. A. de C. V.

FICHA TÉCNICA

VITANICA RZ O

Vitanica® RZ O es un biofungicida con acción estimulante con un contenido de 30 % del extracto de algas *Ecklonia maxima* y 1.2*10^9 UFC/ml de *Bacillus amyloliquefaciens* cepa R6-CDX®.

Recomendaciones de aplicación:

CULTIVO	INTERVALO DE SEGURIDAD	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Aguacate	0 días	**Tristeza del aguacatero** (*Phythopthora cinnamomi*)	2.0-6.0	Realizar 3 aplicaciones al suelo a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 900 L de agua/ha.
Berenjena, Chile, Jitomate, Okra, Papa, Pimiento morrón, Tomate verde	0 días	**Marchitez vascular** (*Fusarium oxysporum*)	2-6	Realizar 3 aplicaciones "In drench" a intervalo de 7 días de manera preventiva, antes de manifestarse los primeros síntomas, volumen de aplicación sugerido 600 L de agua/ha.
Arándano, Frambuesa, Fresa, Grosella, Kiwi, Vid, Zarzamora	0 días	**Cenicilla** (*Sphaerotheca macularis*) **Moho gris** (*Botrytis cinerea*)	2-6	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días de manera preventiva, antes de manifestarse los primeros síntomas; volumen de aplicación sugerido 500 L de agua/ha.
Cidro, Mandarino, Naranja, Lima, Limón, Pomelo, Tangerino, Toronja.	0 días	**Antracnosis** (*Colletrtrichum acutatum*)	1-3	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 5 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 900 L de agua/ha.
Banano	0 días	**Sigatoka** (*Mycosphaerella fijensis*)	1-3	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 5 días, cuando se detecten las condiciones apropiadas para el desarrollo de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Abra con cuidado el envase de Vitanica RZ, mida con una probeta de plástico la cantidad indicada de Vitanica RZ, mezcle en una cubeta la cantidad de producto a utilizar y agite, posteriormente agregue al tanque de aplicación y agite nuevamente. NO EXPONER EL PRODUCTO AL SOL