EXPERTS FOR GROWTH

COMPO EXPERT®

Basfoliar® K SP

¡DALE TAMAÑO Y SABOR A SUS CULTIVOS!

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	Potasio (P^2O^5)	Magnesio (MgO)	Azufre (S)
	40%	2%	1%

BENEFICIOS EN SU APLICACIÓN

- Aumenta el tamaño, el color, el sabor y la firmeza de los frutos.
- Mejora la vida post-cosecha de frutos almacenados en frio.
- Estimula la formación y la movilidad de carbohidratos (azúcares) desde las hojas a los frutos.
- Aumenta la resistencia de las plantas a estrés por falta de aqua.

www.compo-expert.com.mx

ESCANEA EL CÓDIGO Y CONOCE TODA LA LÍNEA COMPO EXPERT

Basfoliar® K SP

¡ DALE TAMAÑO Y SABOR A SUS CULTIVOS !

Basfoliar® K SP es un fertilizante foliar complementario específico formulado como polvo soluble a base de óxido de potasio (K2O) y magnesio.

Basfoliar® K SP favorece el tamaño y color de los frutos, al suplir la alta demanda de potasio en el último tercio de crecimiento del fruto. Por su form lación Polvo Soluble y su alta calidad, no presenta riesgo de manchado de frutos incluso 1 día antes de la cosecha. Se recomienda como complemento de la fertilización al suelo.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS L/Ha	TEMPORALIDAD
Jitomate y Pimiento	2 a 3	Desde inicio de cuaje de los primeros frutos.
Melón y Sandía	1 a 2	Desde inicio de cuaje de los primeros frutos.
Pepino y Calabaza	1 a 2	A partir de fructificación.
Papa	1.5 a 3	Desde inicio de formación de tubérculo.
Aguacate	2 a 4	A partir de llenado de frutos.
Cítricos	1.5 a 3	A partir de llenado de frutos.
Manzana, Pera y Duraznos	2 a 4	Frutos con desarrollo intermedio 50, 35 y 20 días antes de cosecha en variedades tardías. En variedades tempranas: 20, 30 y 40 días antes de cosecha.
Vid	2 a 3	En prefloración y formación de baya de 5 a 7 mm.
Fresa, Frambuesa y Zarzamora	1.5 a 2	A partir de la cuaja de los primeros frutos.
Cebolla y Ajo	1.5 a 2	En pleno crecimiento vegetativo hasta formación de bulbo.
Papaya	2 a 3	A partir de cuaje de fruta hasta cosecha.
Plátano	2 a 4	Durante todo el ciclo (cultivo en producción).
Leguminosas	1 a 2	A partir de prefloración hasta fructificación.
Gramíneas	1 a 2	A partir de los 20 a 45 días después de la siembra.
Flores de Corte	1 a 2	Durante todo el ciclo vegetativo.

• Las dosis aquí recomendadas son orientativas, por lo cual la fertilización se debe ajustar de acuerdo a las condiciones del lugar y del desarrollo del cultivo.

* La velocidad de absorción foliar del K (el 50%) es de 1 a 4 días (Buchner y Sturm, 1985).

PRECAUCIONES. Basfoliar® K SP es un producto ecológicamente compatible y biodegradable en el medio ambiente. **Basfoliar® K SP** es considerado no tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto para el manejo seguro es necesario atenerse a las precauciones de uso de los productos fitosanitarios con que haya sido mezclado **Basfoliar® K SP.**

IDEAL PARA:

- A partir de la cuaja de los primeros frutos en berries, hortalizas y frutales.
- En crecimiento y llenado de fruto en berries, hortalizas y frutales.
- En llenado de grano en cereales y leguminosas.
- Al inicio de estolonización y tuberización en papas.
- En desarrollo y p refloración en frutales.

COMPO EXPERT®

COMPO EXPERT México, S.A. de C.V.
Av. López Mateos Sur # 5060 Int. 3-A Col. Miguel de la Madrid Hurtado, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45239 Tel.:(33) 3612 1512 Fax: (33) 3612 9230
www.compo-expert.com.mx
consulta@compo-expert.com