

Basfoliar® Zn Flo

¡LA DIFERENCIA EN SU COSECHA!



COMPOSICIÓN
GARANTIZADA

Basfoliar® Zn Flo

Zinc (Zn)
25%

BENEFICIOS EN SU APLICACIÓN

- Único producto floable en el mercado, que al mezclarse con el agua da como resultado una solución estable (no precipita).
- Bajo efecto corrosivo en equipos de aplicación aérea.
- Por su alta concentración tiene un mayor efecto residual, lo que significa menos dosis por Ha y menos aplicaciones durante el ciclo del cultivo.
- Amplio rango de compatibilidad con productos para control de plagas y enfermedades.



Basfoliar® Zn Flo

¡ LA DIFERENCIA EN SU COSECHA !

Basfoliar® Zn Flo, es un fertilizante floable con alta concentración de Zinc, diseñado técnicamente para su uso vía foliar, que ayuda a prevenir y corregir de forma inmediata las deficiencias de este micronutriente en los cultivos.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS L/Ha	TEMPORALIDAD
Jitomate y Pimiento	0.5 a 0.75	Crecimiento vegetativo y floración
Melón y Sandía	0.5 a 0.75	A partir de los 15 días después del trasplante
Pepino y calabacita	0.5 a 0.75	En pleno crecimiento vegetativo
Papa	0.5 a 0.75	Desde las primeras 4 hojas
Brócoli y Coliflor	0.5 a 0.75	En pleno crecimiento vegetativo
Aguacate	0.5 a 1	En cada flujo de crecimiento vegetativo y prefloración
Cítricos	0.7 a 1	En cada flujo de crecimiento vegetativo y prefloración
Manzana y Pera (post-cosecha)	0.7 a 1 0.5 a 1	En puntas verdes y en fruto de 2 a 3 cm en adelante Aplicar con hojas totalmente activas
Durazno	0.7 a 1	A partir de brotes de 5 a 10 cm
Nogal	0.7 a 1	En inicio de brotación de yemas florales (Abril)
Vid	0.7 a 1	A partir de brotes de 20 a 30 cm de largo
Fresa, Zarzamora y Frambuesa	0.5 a 0.75	Desde prefloración cada 30 días, repetir a 0.3 L/ha después de cosecha (repuntantes)
Maíz y Trigo	0.5 a 0.75	A partir de los 25 días después de germinación.
Cebolla y Ajo	0.5 a 0.75	A partir de 30 días post-trasplante
Papaya	0.7 a 1	En pleno crecimiento vegetativo a inicio de cosecha
Plátano	0.7 a 1	En pleno crecimiento vegetativo
Flores de corte	0.5 a 0.75	En pleno crecimiento vegetativo y formación de botones florales

- Las dosis aquí recomendadas son orientativas, por lo cual la fertilización se debe ajustar de acuerdo a las condiciones del lugar y del desarrollo del cultivo.

PRECAUCIONES: Por ser un producto de alta concentración de Zn, su uso debe basarse en un diagnóstico correcto con la ayuda del análisis foliar y/o en la sintomatología del cultivo. **Basfoliar® Zn Flo** se debe aplicar siempre bajo condiciones de secado rápido. Evitar aplicaciones en días de alta humedad relativa. **Basfoliar® Zn Flo** es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso convencional. Por lo tanto, para el manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones de uso de los productos fitosanitarios con los que haya sido mezclado.

IDEAL PARA:

- En aplicaciones al momento de trasplante de berries y hortalizas.
- Antes de floración y después de cosecha en nogal y aguacate.
- Durante flujo de crecimiento de primavera y otoño en cítricos.
- Después de establecimiento hasta cosecha en hortalizas.
- Previo a floración en berries.



COMPO EXPERT México, S.A. de C.V.

Av. López Mateos Sur # 5060 Int. 3-A Col. Miguel de la Madrid Hurtado, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45239 Tel.:(33) 3612 1512 Fax: (33) 3612 9230
www.compo-expert.com.mx
consulta@compo-expert.com