

COMPO EXPERT MÉXICO S. A. de C. V.

FICHA TÉCNICA

HydroSpeed® CaB Max



Fertilizante soluble en agua con contenido de Nitrógeno, Calcio y Boro.
Libre de Sodio y urea, bajo en cloruros (Cl<1%).

Registro COFEPRIS: RSCO-447/IX/23

Datos técnicos

Composición garantizada.	%
Nitrógeno (N)	15
Nitrógeno nítrico (NO ₃)	14.30
Nitrógeno amoniacal (NH ₄)	0.70
Calcio (CaO)	27.00
Boro (B)	0.20

Propiedades físicas

Características físicas:

Hojuelas

Color:

Blanco/amarillento

Densidad aparente:

aprox. 950 g/l

Almacenamiento:

HydroSpeed® CaB Max puede ser almacenado en su contenedor original cerrado por muchos años. Los envases abiertos deben usarse o cerrarse de inmediato; el producto es higroscópico.

COMPO EXPERT MÉXICO S. A. de C. V.

FICHA TÉCNICA

HydroSpeed® CaB Max

HydroSpeed® CaB-Max es un fertilizante diseñado para su uso en fertirriego que contiene; Calcio, Boro y Nitrógeno para la etapa de alta demanda de Calcio y Boro cuando la planta se encuentra en cuaje y llenado de fruto.

BENEFICIOS:

HydroSpeed® CaB-Max actúa incrementando el nivel de disponibilidad de Calcio y Boro en el suelo y con la presencia de Boro en la planta se facilita el metabolismo del Calcio. Con la aplicación de **HydroSpeed® CaB-Max** se evitan las deficiencias de Calcio en la planta, principalmente cuando es aplicado en etapa de llenado de fruto.

Cultivo	Dosis (Kg/Ha/Aplicación)	Temporalidad
Frutales: Naranja, Toronja, Limón, Lima Persa, Aguacate, Nogal, Manzano, Durazno, Mango	10 a 20	Desde inicio de cuajado y durante llenado de fruto
Papaya	10 a 20	Desde inicio de cuajado y durante llenado de fruto
Uva de mesa	10 a 20	Desde inicio de cuajado y durante llenado de fruto
Papa	10 a 20	Aplicar desde el inicio de la etapa de estolones
Fresa, Frambuesa, Zarzamora, Arándano	10 a 15	Aplicar cada semana después de inicio de floración
Hortalizas de fruto: Tomate, Tomate verde, Pimiento, Chile, Pepino, Sandía, Melón, Calabaza	10 a 20	Aplicar cada semana después de floración
Cebolla, Ajo	10 a 20	Aplicar a partir del inicio de formación de bulbos
Rosal de corte, Gerbera	10 a 15	Aplicar cada semana, iniciar a partir del primer corte
Crucíferas: Coliflor, Brócoli	10 a 15	Aplicar desde aparición de florete
Banano	10 a 15	En huertos nuevos usar la dosis baja y aplicar a partir de la parición
	10 a 20	En huertos en producción, aplicar durante todo el ciclo del cultivo